

## 大腸がん(Colorectal Cancer)

・d1=1日目、d1-14=初日から14日間(1日2回の場合、1日目の夕から15日目の朝など)

レジメン名	略語	一般名	投与量	投与方法	投与時間	投与日	1コース	補足
CAPOX	Cape	カペシタビン	1000mg/m <sup>2</sup> /回	経口	1日2回	d1-14	3週毎	術後補助・進行再発 IDEA研究
	I-OHP	オキサリプラチン	130mg/m <sup>2</sup>	点滴	2時間	d1		
mFOLFOX6	I-OHP	オキサリプラチン	85mg/m <sup>2</sup>	点滴	2時間	d1	2週毎	MOSAIC試験 術後補助・進行再発 (小腸癌に適応あり)
	I-LV	レボホリナートCa	200mg/m <sup>2</sup>	点滴	2時間	d1		
	5-FU(b)	5-フルオロウラシル	400mg/m <sup>2</sup>	点滴	10分	d1		
	5-FU(c)	5-フルオロウラシル	2400mg/m <sup>2</sup>	持続点滴	46時間	d1-3		
Cape 単剤	Cape	カペシタビン	1250mg/m <sup>2</sup> /回	経口	1日2回	d1-14	3週毎	術後補助
S-1 単剤	S-1	テガフル・キメラシル・オテラシル	40~60mg/回	経口	1日2回	d1-28	6週毎	ACTS-CC試験
UFT/LV	UFT	テガフル・ウラシル	300mg/m <sup>2</sup> /日	経口	1日3回	d1-28	5週毎	術後補助・進行再発
	LV	ホリナートCa	75mg/日	経口	1日3回	d1-28		
Cape+RT	Cape	カペシタビン	825mg/m <sup>2</sup> /回	経口	1日2回	d1-5	1週毎	放射線照射日に服用
レジメン名	略語	一般名	投与量	投与方法	投与時間	投与日	1コース	補足
Cape+BEV	Cape	カペシタビン	1000mg/m <sup>2</sup> /回	経口	1日2回	d1-14	3週毎	CAIRO 3試験
	BEV	ベバシズマブ	7.5mg/kg	点滴	90⇒60⇒30分	d1		
CAPOX±BEV	Cape	カペシタビン	1000mg/m <sup>2</sup> /回	経口	1日2回	d1-14	3週毎	NO16966試験
	I-OHP	オキサリプラチン	130mg/m <sup>2</sup>	点滴	2時間	d1		
	BEV	ベバシズマブ	7.5mg/kg	点滴	90⇒60⇒30分	d1		
mFOLFOX6+BEV	I-OHP	オキサリプラチン	85mg/m <sup>2</sup>	点滴	2時間	d1	2週毎	
	I-LV	レボホリナートCa	200mg/m <sup>2</sup>	点滴	2時間	d1		
	5-FU(b)	5-フルオロウラシル	400mg/m <sup>2</sup>	点滴	10分	d1		
	5-FU(c)	5-フルオロウラシル	2400mg/m <sup>2</sup>	持続点滴	46時間	d1-3		
	BEV	ベバシズマブ	5mg/kg	点滴	90⇒60⇒30分	d1		
SOX(130)±BEV	BEV	ベバシズマブ	7.5mg/kg	点滴	90⇒60⇒30分	d1	3週毎	SOFT試験
	S-1	テガフル・キメラシル・オテラシル	40~60mg/回	経口	1日2回	d1-14		
	I-OHP	オキサリプラチン	130mg/m <sup>2</sup>	点滴	2時間	d1		

レジメン名	略語	一般名	投与量	投与法	投与時間	投与日	1コース	補足
FOLFIRI±BEV	BEV	ベバシズマブ	5mg/kg	点滴	90⇒60⇒30分	d1	2週毎	BICC-C試験 FIRE-3試験
	CPT-11	イリノテカン	150mg/m <sup>2</sup>	点滴	2時間	d1		
	I-LV	レボホリナートCa	200mg/m <sup>2</sup>	点滴	2時間	d1		
	5-FU(b)	5-フルオロウラシル	400mg/m <sup>2</sup>	点滴	10分	d1		
	5-FU(c)	5-フルオロウラシル	2400mg/m <sup>2</sup>	持続点滴	46時間	d1-3		
sLV5FU2±BEV	BEV	ベバシズマブ	5mg/kg	点滴	90⇒60⇒30分	d1	2週毎	
	I-LV	レボホリナートCa	200mg/m <sup>2</sup>	点滴	2時間	d1		
	5-FU(b)	5-フルオロウラシル	400mg/m <sup>2</sup>	点滴	10分	d1		
	5-FU(c)	5-フルオロウラシル	2400mg/m <sup>2</sup>	持続点滴	46時間	d1-3		
mFOLFOX6+PANI	PANI	パニツムマブ	6mg/kg	点滴	60分	d1	2週毎	PRIME試験
	I-OHP	オキサリプラチン	85mg/m <sup>2</sup>	点滴	2時間	d1		
	I-LV	レボホリナートCa	200mg/m <sup>2</sup>	点滴	2時間	d1		
	5-FU(b)	5-フルオロウラシル	400mg/m <sup>2</sup>	点滴	10分	d1		
	5-FU(c)	5-フルオロウラシル	2400mg/m <sup>2</sup>	持続点滴	46時間	d1-3		
FOLFOXIRI±BEV	BEV	ベバシズマブ	5mg/kg	点滴	90⇒60⇒30分	d1	2週毎	TRIBE試験、 QUATTRO試験
	CPT-11	イリノテカン	165mg/m <sup>2</sup>	点滴	60分	d1		
	I-OHP	オキサリプラチン	85mg/m <sup>2</sup>	点滴	2時間	d1		
	I-LV	レボホリナートCa	200mg/m <sup>2</sup>	点滴	2時間	d1		
	5-FU(c)	5-フルオロウラシル	3200mg/m <sup>2</sup>	点滴	48時間	d1-3		
FOLFIRI+PANI	PANI	パニツムマブ	6mg/kg	点滴	60分	d1	2週毎	20050181試験
	CPT-11	イリノテカン	150mg/m <sup>2</sup>	点滴	2時間	d1		
	I-LV	レボホリナートCa	200mg/m <sup>2</sup>	点滴	2時間	d1		
	5-FU(b)	5-フルオロウラシル	400mg/m <sup>2</sup>	点滴	10分	d1		
	5-FU(c)	5-フルオロウラシル	2400mg/m <sup>2</sup>	持続点滴	46時間	d1-3		
FOLFIRI+RAM	RAM	ラムシルマブ	8mg/kg	点滴	60⇒30分	d1	2週毎	RAISE試験
	CPT-11	イリノテカン	150mg/m <sup>2</sup>	点滴	2時間	d1		
	I-LV	レボホリナートCa	200mg/m <sup>2</sup>	点滴	2時間	d1		
	5-FU(b)	5-フルオロウラシル	400mg/m <sup>2</sup>	点滴	10分	d1		
	5-FU(c)	5-フルオロウラシル	2400mg/m <sup>2</sup>	持続点滴	46時間	d1-3		

レジメン名	略語	一般名	投与量	投与法	投与時間	投与日	1コース	補足
FOLFIRI+AFL	AFL	アフリベルセプト	4mg/kg	点滴	60分	d1	2週毎	VELOUR試験
	CPT-11	イリノテカン	150mg/m <sup>2</sup>	点滴	2時間	d1		
	I-LV	レボホリナートCa	200mg/m <sup>2</sup>	点滴	2時間	d1		
	5-FU(b)	5-フルオロウラシル	400mg/m <sup>2</sup>	点滴	10分	d1		
	5-FU(c)	5-フルオロウラシル	2400mg/m <sup>2</sup>	持続点滴	46時間	d1-3		
IRIS	S-1	テガフル・ギメラシル・オテラシル	40~60mg/回	経口	1日2回	d1-14	4週毎	FIRIS試験
	CPT-11	イリノテカン	125mg/m <sup>2</sup>	点滴	90分	d1・15		
IRIS+PANI	S-1	テガフル・ギメラシル・オテラシル	40~60mg/回	経口	1日2回	d1-14	4週毎	
	CPT-11	イリノテカン	100mg/m <sup>2</sup>	点滴	90分	d1・15		
	PANI	パニツムマブ	6mg/kg	点滴	60分	d1・15		
SIRB	BEV	ベバシズマブ	7.5mg/kg	点滴	90⇒60⇒30分	d1	3週毎	TRICOLORE試験
	S-1	テガフル・ギメラシル・オテラシル	40~60mg/回	経口	1日2回	d1-14		
	CPT-11	イリノテカン	150mg/m <sup>2</sup>	点滴	90分	d1		
CAPIRI±BEV	BEV	ベバシズマブ	7.5mg/kg	点滴	90⇒60⇒30分	d1	3週毎	AXEPT試験
	CPT-11	イリノテカン	200mg/m <sup>2</sup>	点滴	90分	d1		
	Cape	カペシタビン	800mg/m <sup>2</sup> /回	経口	1日2回	d1-14		
CPT-11+BEV	CPT-11	イリノテカン	150mg/m <sup>2</sup>	点滴	90分	d1	2週毎	
	BEV	ベバシズマブ	5mg/kg	点滴	90⇒60⇒30分	d1		
CPT-11+PANI	CPT-11	イリノテカン	150mg/m <sup>2</sup>	点滴	90分	d1	2週毎	GERCOR試験
	PANI	パニツムマブ	6mg/kg	点滴	60分	d1		
FTD/TPI +BEV	BEV	ベバシズマブ	5mg/kg	点滴	90⇒60⇒30分	d1・15	4週毎	
	FTD/TPI	トリフルリジン・チピラシル	35mg/m <sup>2</sup> /回	経口	1日2回	d1-5、d8-12		
UFT/LV+BEV	BEV	ベバシズマブ	5mg/kg	点滴	90⇒60⇒30分	d1・15	4週毎	J-BLUE試験
	UFT	テガフル・ウラシル	300mg/m <sup>2</sup> /日	経口	1日3回	d1-21		
	LV	ホリナートCa	75mg/日	経口	1日3回	d1-21		
CPT-11 単剤	CPT-11	イリノテカン	150mg/m <sup>2</sup>	点滴	90分	d1	2週毎	
ベクティビックス®	PANI	パニツムマブ	6mg/kg	点滴	60分	d1	2週毎	20050216試験
スチバーガ®	REG	レゴラフェニブ	160mg/回	経口	1日1回	d1-21	4週毎	CORRECT試験
ロンサーフ®	FTD/TPI	トリフルリジン・チピラシル	35mg/m <sup>2</sup> /回	経口	1日2回	d1-5、d8-12	4週毎	RECOURSE試験

レジメン名	略語	一般名	投与量	投与方法	投与時間	投与日	1コース	補足
キイトルーダ®	Pembro	ペムブロリズマブ	200mg固定/回	点滴	30分	d1	3週毎	MSI-High TMB-High
			400mg固定/回				6週毎	

レジメン名	略語	一般名	投与量	投与方法	投与時間	投与日	1コース	補足
Ipi+Nivo	Nivo	ニボルマブ	240mg固定/回	点滴	30分	d1	3週毎	MSI-High 4回
	Ipi	イピリムマブ	1mg/kg	点滴	30分	d1		
オプジーボ®	Nivo	ニボルマブ	240mg固定/回	点滴	30分	d1	2週毎	MSI-High
			480mg固定/回				4週毎	

レジメン名	略語	一般名	投与量	投与方法	投与時間	投与日	1コース	補足
ビラフトビ®+メクトビ® +CET	ENCO	エンコラフェニブ	300mg/回	経口	1日1回	連日	1週毎	BEACON CRC試験
	BINI	ビニメチニブ	45mg/回	経口	1日2回	連日		
	CET	セツキシマブ	初回400/m <sup>2</sup> 、2回目250/m <sup>2</sup>	点滴	120⇒60分	d1		
ビラフトビ®+CET	ENCO	エンコラフェニブ	300mg/回	経口	1日1回	連日	1週毎	BEACON CRC試験
	CET	セツキシマブ	初回400/m <sup>2</sup> 、2回目250/m <sup>2</sup>	点滴	120⇒60分	d1		

HP	T-mab	トラスツズマブ	初回8mg/kg、維持6mg/kg	点滴	90⇒30分	d1	3週毎	TRIUMPH試験 HER2陽性
	PER	ペルツズマブ	初回840mg/回、維持420mg/回	点滴	60⇒30分	d1		

大腸がん(Colorectal Cancer)